

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в городе Новополоцке на 1 января 2016 года

- По состоянию на 1 января 2016г. в городе Новополоцке зарегистрировано **68** случаев ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – **58**, показатель распространенности составил **54,5** на 100 тысяч населения. За 2015 год выявлено **12** ВИЧ-инфицированных (за 2014 г. – 13). Показатель заболеваемости составил – **11,1** на 100 тысяч населения (за 2014г. – 12,1).
- Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-29 лет составляет **32** человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – **47,0%**). За 2015г. зарегистрирован **1** случай (**1,5%**), за 2014г. – 7 случаев (53,8%). Среди лиц возрастной группы 15-19 лет за 2014-2015гг. случаи не регистрировались.
- Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, выявленных за весь период наблюдения в г.Новополоцке: дети до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 4,4% (3 случая), 20-24 года – 19,1% (13 случаев), 25-29 лет – 23,5% (16 случаев), 30-34 года – 19,1% (13 случаев), 35-39 лет – 17,6 (12 случаев), 40 лет и старше – 16,2% (11 случаев).
- Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в г.Новополоцке за 2015 года: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 0%(0 случаев), 20-24 года – 0% (0 случаев), 25-29 лет – 0,8% (1 случай), 30-34 года – 33,3% (4 случая), 35-39 лет – 33,3% (4 случая), 40 лет и старше – 25,0% (3 случая).
- В целом по городу удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет **41,2%** (**28** чел.), мужчин – **58,8%** (**40** чел.). Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди мужской части населения в **1,4** раза выше, чем среди женской: 70,6 и 54,3 на 100 тысяч населения контингента соответственно. За 2015 год удельный вес женщин – **33,3%** (4 случая), мужчин – **66,7%** (8 случаев).
- Среди женщин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 10,7% (3 случая), 20-24 года – 28,6% (8 случаев), 25-29 лет – 25,0% (7 случаев), 30-34 года – 10,7% (3 случая), 35-39 лет – 10,7% (3 случая), 40 лет и старше – 14,3% (4 случая).

- Среди мужчин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 0,0% (0 случаев), 20-24 года – 12,5% (5 случаев), 25-29 лет – 22,5% (9 случаев), 30-34 года – 25,0% (10 случаев), 35-39 лет – 22,5% (9 случаев), 40 лет и старше – 17,5% (7 случаев).
- По кумулятивным данным (1987 – 01.01.2016) **11,8%** (**8 человек**) инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет **88,2%** (**60 случаев**).
- За 2015 год доля полового пути передачи ВИЧ составила **100%** (**12 чел.**), доля парентерального пути передачи ВИЧ составила **0,0%** (**0 чел.**). За 2014 год доля полового пути передачи – **100%** (**13 чел.**), доля парентерального пути передачи ВИЧ – **0,0%** (**0 чел.**).
- С 1987 года по 01.01.2016 от ВИЧ-инфицированных матерей родилось **9** детей, в том числе за 2015 года – **1** ребенок. Случаев ВИЧ-инфекции среди детей не зарегистрировано.
- Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.01.2016 – **15**, в том числе за 2015 год данный диагноз установлен **3** пациентам. Кумулятивное число случаев пре-СПИДа на 01.01.2016 – **24** (за 2015 год – **1**).
- Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло **10** чел. (в том числе в стадии СПИДа – **8** чел.). За 2015 год умерших – **1** чел., в стадии СПИДа – **1** чел. (за 2014 год умерших – **1** чел., в стадии СПИДа – **1** чел.).