

## **Эпидситуация по ВИЧ-инфекции в городе Новополоцке на 1 июля 2016 года**

- По состоянию на 1 июля 2016г. в городе Новополоцке зарегистрирован **71** случай ВИЧ-инфекции, количество людей, живущих с ВИЧ – **61**, показатель распространенности составил **56,3** на 100 тысяч населения. Показатель заболеваемости составил – **2,8** на 100 тысяч населения (за январь-июнь 2015г. – 2,8).
- За январь-июнь 2016г. зарегистрировано по г.Новополоцку 3 новых случая ВИЧ-инфекции (за аналогичный период 2015г. – 3).
- Общее количество случаев ВИЧ-инфекции в возрастной группе 15-29 лет составляет **32** человека (удельный вес в общей структуре ВИЧ-инфицированных – **45,1%**). За январь-июнь 2015-2016гг. случаи не регистрировались. Среди лиц возрастной группы 15-19 лет за январь-июнь 2015-2016гг. случаи не регистрировались.
- Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, выявленных за весь период наблюдения в г.Новополоцке: дети до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 4,2% (3 случая), 20-24 года – 18,3% (13 случаев), 25-29 лет – 22,5% (16 случаев), 30-34 года – 18,3% (13 случаев), 35-39 лет – 19,7 (14 случаев), 40-44 года – 7,0% (5 случаев), 45 лет и старше – 9,8 % (7 случаев).
- Распределение по возрастным группам населения случаев ВИЧ-инфекции, выявленных в г.Новополоцке за январь-июнь 2016 года: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 0,0% (0 случаев), 20-24 года – 0,0% (0 случаев), 25-29 лет – 0,0% (0 случаев), 30-34 года – 0,0% (0 случаев), 35-39 лет – 66,6% (2 случая), 40-44 года – 33,3% (1 случай), 45 лет и старше – 0,0% (0 случаев).
- В целом по городу удельный вес женщин из общего числа ВИЧ-инфицированных составляет **40,8%** (**29**чел.), мужчин – **59,2%** (**42**чел.). Показатель распространенности ВИЧ-инфекции среди мужской части населения в 1,5 раза выше, чем среди женской. За январь-июнь 2016 года удельный вес женщин – **33,3%** (1 случай), мужчин – **66,6%** (2 случая).
- Среди женщин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 10,3% (3 случая), 20-24 года – 27,6% (8 случаев), 25-29 лет – 24,1% (7 случаев),

30-34 года – 10,3% (3 случая), 35-39 лет – 10,3% (3 случая), 40-44 года – 10,3% (3 случая), 45 лет и старше – 6,9 % (2 случая).

- Среди мужчин распределение случаев ВИЧ-инфекции по возрастным группам за весь период наблюдения: до 14 лет – 0,0% (0 случаев), 15-19 лет – 0,0% (0 случаев), 20-24 года – 11,9% (5 случаев), 25-29 лет – 21,4% (9 случаев), 30-34 года – 23,8% (10 случаев), 35-39 лет – 30,9% (13 случаев), 40-44 года – 4,8% (2 случая), 45 лет и старше – 11,9% (5 случаев).

- По кумулятивным данным (1987 – 01.07.2016) **11,3% (8 человек)** инфицированных вирусом иммунодефицита человека заразились парентеральным путем (при внутривенном введении наркотических веществ), удельный вес лиц, инфицирование которых произошло половым путем, составляет **88,7% (63 случая)**.

- За январь-июнь 2016 года доля полового пути передачи ВИЧ составила **100% (3 чел.)**, доля парентерального пути передачи ВИЧ составила **0,0% (0 чел.)**. За январь-июнь 2015 года доля полового пути передачи – **100% (3 чел.)**, доля парентерального пути передачи ВИЧ – **0,0% (0 чел.)**.

- С 1987 года по 01.07.2016 от ВИЧ-инфицированных матерей родилось **9** детей (за январь-июнь 2016 года детей рожденных от ВИЧ-инфицированных матерей не зарегистрировано, за январь-июнь 2015 года – 1 ребенок). Случаев ВИЧ-инфекции среди детей не зарегистрировано.

- Кумулятивное число случаев СПИДа на 01.07.2016 – **16**, за январь-июнь 2016 года зарегистрирован – 1 случай. Кумулятивное число случаев пре – СПИДа на 01.07.2016 – **24** (за январь-июнь 2016 года данный диагноз не зарегистрирован).

- Среди ВИЧ-инфицированных пациентов умерло **10** чел. (в том числе в стадии СПИДа – **8** чел.). За январь-июнь 2016 года умерших не зарегистрировано (за январь-июнь 2015 года умерших не зарегистрировано).